

Gartentipps Februar

Ziergarten

Clematis jetzt schneiden

Die spät im Sommer blühenden Clematis-Sorten sollten jetzt beschnitten werden. Dazu können alle Triebe etwa 40 cm über den Boden und oberhalb einer kräftigen Knospe abgeschnitten werden.

Gemüsegarten

Zwiebeln benötigen keinen Schutz

Wenn die ersten Zwiebelblumen aus der Erde schauen und es erneut schneit, decken viele Gartenbesitzer aus Sorge die Pflanze zu. Keine Angst: Die Knospen überstehen die Kälte, ohne Schaden zu nehmen.

Mischkultur im Garten

Welche Gemüse zusammen gepflanzt werden können, ist nicht nur eine Frage der Ästhetik. Gemüsesorten können sich auch gegenseitig fördern und vor Schädlingen schützen.

Ein bekanntes Paar im Gemüsebeet sind zum Beispiel Möhren und Zwiebeln. Mit ihrem Geruch vertreiben sie wechselseitig die Schädlinge, von denen die anderen leicht befallen werden. Auch Blumenkohl und Sellerie helfen sich gegenseitig. Der Kohl bleibt in Partnerschaft mit Sellerie von gefräßigen Kohlweißlingsrauben verschont, der Sellerie wiederum ist gegen Rostpilz geschützt. Salat schützt Kohlrabi und Rettich vor Erdflöhen, Knoblauch hält Milben von Erdbeeren fern. Partner, die sich gegenseitig im Wachstum fördern, sind Tomaten und Bohnen, Möhren und Straucherbsen, Sellerie und Blumenkohl, Kopfsalat und Radieschen, Gurken und Stangenbohnen, Schnittsalat und Rote Bete, Mangold und Kopfsalat/ Radieschen, Fenchel und Salat/ Gurken.

Dagegen harmonieren nicht miteinander: Lauch und Bohnen oder Erbsen, Zwiebeln und Kohl, Erbsen bzw. Bohnen, Lauch oder Kohl, Kartoffeln und Erbsen, Rote Bete oder Tomaten, Gurken und Tomaten!

Frühkartoffel antreiben

Damit Kartoffeln Anfang April gepflanzt werden können, treibt man sie die nächsten vier bis fünf Wochen vor. Die Knollen werden dazu bei 12° bis 15° C in eine flache Kiste mit einem feuchten Substrat gelegt.

Obstgarten

Frostrisse in Rinde behandeln

Sonnige Tage mit anschließenden Frostnächten können dazu führen, dass die Rinde von Bäumen reißt. Die Verletzungen werden bis ins gesunde Holz ausgeschnitten und mit Wundschutzmittel behandelt.

Winterschnitt von Obstgehölzen

Ein luftigerer Kronenaufbau sorgt für schnelleres Abtrocknen der Blätter bei Regen und senkt die Gefahr von Infektionen durch Apfelschorf oder Monilia-Fäule.

Pflanzenschutz

Schädlinge: Winternester entfernen

Die Gespinnte von Knospenwickler, Baumweißling, Goldafter und Schwammspinner befinden sich in luftiger Höhe an Bäumen. Sie beherbergen Larven und Rauben. Beim Pflegeschnitt können die Winternester samt Bewohnern entfernt werden.

Johannisbeergalmilbe in Knospen

Zeigen sich an der Schwarzen Johannisbeere unnatürlich dicke Knospen, steckt die Johannisbeergalmilbe dahinter. Der Schädling überwintert nämlich in den Knospen. Hier hilft nur rechtzeitiges Entfernen der dicken Knospen, möglichst noch vor dem Austrieb.

Triebe von Stachelbeeren einkürzen

Die Erreger des Amerikanischen Stachelbeermehltaus überwintern in den Triebspitzen. Wenn die Pilzkrankheit schon im vergangenen Jahr aufgetreten ist, sollten Sie alle Triebe um etwa 10 cm einkürzen. Beugen Sie ab Mitte des Monats mit einem mineralischen Stärkungsmittel vor.

Kübelpflanzen zurückschneiden

Manche Kübel- und Balkonpflanze treibt in ihrem Winterquartier vorzeitig aus. Hier hilft ein Rückschnitt, so dass die Pflanze im Frühjahr weiterhin kompakt wachsen.

Obstbaumschnitt vor Blattaustrieb

Der Baumschnitt bei Obstgehölzen sollte noch vor dem Blattaustrieb beendet sein. Geschnitten wird nur bei frostfreiem Wetter. Ausnahmen sind stark wachsende Gehölze: Diese werden erst im Sommer ausgelichtet.

Erstes Gemüse unter Glas säen

Freilandgemüse wie Salat, Kohlrabi, Sellerie, verschiedene Kohllarten und Tomaten können jetzt im Gewächshaus bzw. Frühbeet ausgesät werden. Die Sämlinge werden nach zwei Monaten ins Freie gesetzt.

Jetzt Ligusterhecke verjüngen

Für einen radikalen Rückschnitt der Ligusterhecke ist der Spätwinter ideal. Sie können die Triebe bis weit ins alte Holz kappen. Die Pflanzen treiben im Frühjahr wieder kräftig aus. Im Sommer erfolgt ein zweiter Schnitt.

Frühkartoffel antreiben

Damit Kartoffel Anfang April gepflanzt werden können, treibt man sie die nächsten vier bis fünf Wochen vor. Die Knollen werden dazu bei 12° C bis 15° C in eine flache Kiste mit einem feuchten Substrat gelegt.

Frostrisse in Rinde behandeln

Sonnige Tage mit anschließenden Frostnächten können dazu führen, dass die Rinde von Bäumen reißt. Die Verletzungen werden bis ins gesunde Holz ausgeschnitten und mit Wundschutzmittel behandelt.